

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

04.07 200 11

ORDIN
ПРИКАЗ

Nr. 555

mun. Chișinău

**Cu privire la implementarea
vaccinului pentavalent DTP-НepB-Hib
pentru imunizarea copiilor**

Întru realizarea prevederilor Programului Național de Imunizări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1192 din 23.12.2010 (MO nr. 259-263, art. nr. 1319 din 31.12.2010), reieșind din angajamentele acordului bilateral a Republicii Moldova și a Alianței Globale pentru Vaccinuri și Imunizări (în continuare – GAVI), având suportul acordat de GAVI, în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,

ORDON:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind implementarea și utilizarea în continuare a vaccinului pentavalent DTP-НepB-Hib pentru vaccinarea copiilor contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B și infecției cu *Haemophilus influenzae* tip B, conform anexei.
2. A implementa în practica medicală vaccinarea copiilor contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B și infecției cu *Haemophilus influenzae* tip b cu vaccinul combinat DTP-НepB-Hib, administrat la vârstele de 2, 4 și 6 luni, începând cu luna iulie 2011.
3. Conducătorii IMSP republicane, Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, Direcției Sănătății și Protecției Sociale a populației UTA Găgăuzia, Secției Sănătate a primăriei mun. Bălți, IMSP Centre ale Medicilor de Familie, IMSP spitale municipale și raionale, organelor și instituțiilor ocrotirii sănătății din municipiile Tiraspol, Bender, raioanele Camenca, Dubăsari, Grigoriopol, Rîbnița, Slobozia, începând cu 01.07.2011 vor asigura organizarea și realizarea vaccinării copiilor contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B și infecției cu *Haemophilus influenzae* tip b, în conformitate cu Calendarul de vaccinări obligatorii pentru anii 2011 - 2015, respectând prevederile anexei aprobate prin prezentul ordin.
4. Conducătorii Centrului Național de Sănătate Publică, Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului, Centrelor de Sănătate Publică teritoriale și Centrelor de Igienă și Epidemiologie:

- 1) vor acorda suport consultativ - metodic lucrătorilor medicali din instituțiile de medicină primară în scopul realizării imunizării copiilor cu vaccinul pentavalent DTP-HepB-Hib;
 - 2) vor asigura supravegherea și evaluarea efectuării vaccinărilor cu vaccinul pentavalent DTP-HepB-Hib.
5. Conducătorii Centrului Național de Sănătate Publică, Centrelor de Sănătate Publică teritoriale și Centrelor de Igienă și Epidemiologie vor asigura instituțiile medico-sanitare publice cu vaccinul pentavalent DTP-HepB-Hib, conform programului de vaccinare.
6. Directorul general al Centrului Național de Sănătate Publică (dl. Ion Bahnarel) de comun cu Direcția politici buget și finanțe (dna Lilea Gantea) vor asigura achiziționarea vaccinului pentavalent DTP-HepB-Hib, în conformitate cu prevederile condițiilor de co-finanțare în procurarea vaccinului respectiv dintre Ministerul Sănătății și GAVI și modul stabilit de achiziții, prin actele normative de domeniu.

Controlul îndeplinirii ordinului dat se asumă D-lui Mihail Magdei, viceministru.

Ministru



Andrei USATÎI

Anexă
la ordinul MS RM nr. 555
din 04.07 2011

Instrucțiunea
privind implementarea și utilizarea în continuare a vaccinului pentavalent
DTP-HepB-Hib pentru vaccinarea copiilor contra difteriei, tetanosului, tusei
convulsive, hepatitei virale B și infecției cu Haemophilus influenzae tip b

Vaccinarea copiilor contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B și infecției cu Haemophilus influenzae tip b se va efectua în conformitate cu Calendarul de vaccinări obligatorii pentru anii 2011 – 2015, respectând următoarele principii:

1. Prima doză de vaccin monovalent contra hepatitei virale B se va administra în maternități în primele 24 ore de la naștere.
2. În cazuri excepționale în care acest termen n-a fost respectat, prima doză de vaccin contra hepatitei virale B se va administra cât mai curând posibil de la momentul nașterii.
3. Vaccinarea cu vaccinul pentavalent DTP-HepB-Hib se va iniția la copiii de la vârsta de 2 luni, aplicând la cursul integral de vaccinare 3 doze a câte 0,5 ml de vaccin DTP-HepB-Hib copiilor la vârstele de 2, 4 și 6 luni, concomitent cu vaccinarea contra poliomielitei (VPO).
4. În cazul imposibilității respectării schemei indicate de vaccinare, din cauza contraindicațiilor medicale, aplicarea dozelor respective se va efectua cu interval minimal de 30 zile între ele.
5. Vaccinarea cu vaccinul DTP-HepB-Hib se va efectua cu respectarea strictă a indicațiilor și contraindicațiilor către vaccinare, conform instrucției de utilizare a preparatului de la producător.
6. Copiilor cu vârsta până la 2 ani, vaccinul DTP-HepB-Hib va fi inoculat intramuscular în partea antero-laterară a coapsei, iar după vârsta de 2 ani - în mușchiul deltoid.
7. În caz de reacții adverse (febră peste 38,5⁰C, reacții anafilactice, plâns neîntrerupt mai mult de 3 ore) la vaccinul DTP-HepB-Hib, finalizarea ciclului primar de vaccinare se va efectua cu preparate separate: anatoxina diftero-tetică pediatrică DT și vaccin contra hepatitei virale B monovalent cu înregistrarea și raportarea cazurilor de reacții adverse în modul stabilit.
8. În perioada de tranziție, de la aplicarea preparatelor separate DTP-Hib și HepB vor fi respectate următoarele principii:
 - 1) copiilor, care au primit două doze de vaccinuri separate DTP-Hib și HepB, sau DTP și HepB – la a treia doză se va administra vaccinul pentavalent DTP-HepB-Hib;
 - 2) copiilor, care au primit 2 doze de vaccin HepB (majoritatea născuți în luna mai 2011), se vor administra 2 doze DTP-Hib sau DTP, iar la a treia doză - vaccinul pentavalent DTP-HepB-Hib;

- 3) copiilor, care au primit 2 doze de vaccin HepB și o doză de vaccin DTP-Hib, la a doua doză de vaccinare se va administra vaccinul DTP-Hib pînă la finalizarea rezervelor de acest preparat, sau vaccinul DTP;
 - 4) copiilor, care au primit câte o doză de vaccin HepB și DTP-Hib sau DTP, la următoarele două doze se va administra vaccinul pentavalent DTP-HepB-Hib.
9. Prima revaccinare contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive la vârsta de 22-24 luni se va efectua cu vaccinul DTP, concomitent cu VPO.
 10. În cazul utilizării vaccinului pentavalent DTP-HepB-Hib, ambalat în flacoane multidoză, flaconul deschis poate fi utilizat timp de 4 săptămâni, cu respectarea strictă a condițiilor de folosire a flacoanelor deschise, expuse în instrucțiunea de folosire a preparatului, conform documentului OMS WHO/V&B/ 00.09. martie 2000).