



ORDIN  
ПРИКАЗ

„24” octombrie 2007

Nr.398

mun.Chișinău

Cu privire la planificarea vaccinărilor  
pentru anul 2008 și organizarea efectuării  
lor.

In scopul realizării țintelor operaționale ale Programului Național de Imunizări (PNI) privind diminuarea morbidității și mortalității prin boli infecțioase, prevenibile prin vaccinări și atingerea sarcinilor de acoperire vaccinală,

**ORDON:**

1. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare republicane și raionale, Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, Secției Sănătate a primăriei municipiului Bălți, Direcției Sănătății și Protecției Sociale a UTA Găgăuzia, USMF Nicolae Testemițanu și colegiilor de medicină, serviciilor medico-sanitare ale Ministerelor și Autorităților administrative centrale, medicii șefi ai Centrelor Medicină Preventivă; conducătorii organelor și instituțiilor ocrotirii sănătății, și medicii șefi a CIE din municipiile Tiraspol și Bender, raioanele Dubăsari, Grigoriopol, Camenca, Rîbnița și Slobozia vor asigura:

1. Efectuarea planificării vaccinărilor profilactice pentru a.2008 pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie a.2007 în conformitate cu prevederile Programului Național de Imunizări, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 523 din 16 mai 2006 "Privind aprobarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2006 - 2010", respectând următoarele cerințe:

a) Recensământul și evidența populației

- A asigura efectuarea de către instituțiile de asistență medicală primară și serviciile medico-sanitare ale Ministerelor și Autorităților administrative centrale a recensământului și evidenței populației în sectorul deservit, atrăgând atenție specială contingentelor social-vulnerabile și copiilor lăsați de către părinți în îngrijire altor persoane. A actualiza, corespunzător, Registrul de evidență a stării sănătății populației (datele generale) F 166/e,

Registrul de evidență a vaccinărilor preventive, formular 063-1/e,  
Fișele de evidență a vaccinărilor preventive nr,063/e.

b) Imunizări împotriva tuberculozei (BCG).

- Vaccinarea copiilor împotriva tuberculozei va fi planificată de către maternități, în baza numărului mediu de nașteri din ultimii 2 ani, incluzând atât copiii născuți în maternitate, cât și cei născuți în afara maternității. Se va ține cont de tendința natalității manifestată pe parcursul a.2006 - 2007.
- Instituțiile de asistență medicală primară vor planifica accinarea BCG numai pentru copiii aflați la evidență, care nu au primit vaccinarea BCG în maternitate.
- Revaccinarea la vârsta de 6-7 ani (copii născuți în anul 2001) va fi planificată pentru lunile septembrie-octombrie în baza cerințelor Dispoziției MS RM Nr.168d din 12.09.2001. Ea poate fi planificată și efectuată concomitent cu revaccinarea împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei (ROR) sau cu respectarea intervalului de 30 zile de la imunizarea ROR.

c) Imunizarea nou-născuților împotriva hepatitei virale B.

- Vaccinarea cu prima doză împotriva hepatitei virale B va fi planificată de către maternități, în baza numărului mediu de nașteri din ultimii 2 ani, incluzând atât copiii născuți în maternitate, cât și cei născuți în afara maternității. Se va ține cont de tendința natalității manifestată pe parcursul a.2006-2007.
- Vaccinarea cu doza a doua și a treia va fi planificată la vârstele de 1 și 6 luni de către instituțiile de asistență medicală primară.

d) Imunizări împotriva poliomielitei (VPO).

- Vaccinarea va fi planificată conform calendarului de vaccinări la vârstele 2, 4, 6 luni.
- Revaccinarea I VPO la vârsta 22-24 luni va fi planificată și se va efectua conform calendarului de vaccinări.
- Revaccinarea II VPO la 6-7 ani (a.n.2001) va fi planificată și se va efectua concomitent cu revaccinarea împotriva difteriei și tetanosului pentru lunile martie-aprilie a.2008.

e) Imunizări împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive (DTP).

- Vaccinarea va fi planificată conform calendarului de vaccinări la vârstele 2,4, 6 luni.
- Revaccinarea I DTP la vârsta 22-24 luni va fi planificată și se va efectua conform calendarului de vaccinări.

f) Vaccinarea împotriva difteriei și tetanosului a adolescenților și adulților.

Adulții și adolescenții, ne vaccinați anterior sau ale căror date de imunizare nu pot fi stabilite, vor fi planificați pentru vaccinarea cu două doze de anatoxină diftero - tetanică pentru adolescenți și adulți (Td) cu interval de 45 zile și o revaccinare ulterioară peste 6-9 luni de la doza a doua de Td.

g) Revaccinările diftero-tetanice la copii și adolescenți.

- Revaccinarea cu vaccin diftero - tetanic pentru copii (DT) la vârsta de 6-7ani (anul nașterii 2001) va fi planificată pentru lunile martie-aprilie a.2008, concomitent cu imunizarea împotriva poliomielitei.
- Revaccinarea adolescenților la vârsta de 14-15 ani (anul nașterii 1993) cu vaccin diftero -tetanic pentru adulți și adolescenți (Td) va fi planificată pentru lunile martie-aprilie a.2008.

h) Revaccinările diftero - tetanice la adulți (Td").

- Vor fi planificate conform calendarului de vaccinări la vârstele 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ani (corespunzător anul nașterii 1988, 1983, 1978, 1973, 1968, 1958, 1948). Vor fi planificate toate persoanele de vârsta menționată aflate la evidență în instituția medicală după locul de domiciliu indiferent dacă la momentul planificării persoana este plecată temporar de la domiciliu (lucru peste hotare, etc).
- În plan vor fi incluse de asemeni și persoanele ne vaccinate conform vârstei și planului de vaccinări în a.2007.
- în scopul asigurării cu cantitățile necesare de vaccin, imunizările date vor fi planificate 75% în trimestrele I-II și 25% în trimestrul IV.

i) Imunizări împotriva ruieolei, oreionului, rubeolei (ROR)

- La vaccinarea primară cu vaccin combinat ROR vor fi planificați copiii care ating vârsta de 12 luni. Pentru vaccinarea acestui contingent va fi folosit preponderent vaccinul ambalat câte o doză în flacon. Ca excepție, în cazul folosirii vaccinului ambalat câte 10 doze în flacon, în scopul reducerii pierderilor de vaccin, este recomandată adunarea mai multor copii la o sesiune de imunizare. În acest scop se admite amânarea vaccinării, dar nu mai târziu de vârsta de 15 luni. În cazul când situația demografică nu permite de a aduna un număr necesar de copii (în localități mici), se recomandă de a invita în aceiași zi la imunizare și copii care necesită revaccinarea ROR (a.n.2001).
- Revaccinarea cu vaccin combinat ROR la vârsta de 6-7ani (anul nașterii 2001) va fi planificată, ca regulă, pentru lunile septembrie-octombrie separat sau în aceiași zi cu revaccinarea BCG. Revaccinarea ROR va fi aplicată cât mai curând posibil după intrarea copiilor în școală și în caz, când va fi aplicată separat, se va planifica înainte de revaccinarea BCG. În scopul utilizării raționale a vaccinului ROR din flacoanele de 10 doze se admite pentru localități rurale mici ca revaccinarea să fie efectuată treptat pe parcursul anului, în zilele vaccinării copiilor de vârsta 12-15 luni.
- Vaccinarea și revaccinarea ROR va fi efectuată tuturor copiilor, indiferent de faptul dacă au suportat anterior rujeola, oreionul sau rubeola sau au fost vaccinați împotriva uneia din aceste trei infecții. În asemenea cazuri va fi respectat un interval de cel puțin 6 luni de la data îmbolnăvirii sau vaccinării.

j) Vaccinarea copiilor împotriva infecției cu Haemophilus influenzae tip b (Hib) pentru anul 2008, se preconizează din a doua jumătate a anului 2008. Instrucțiunile detaliate privind planificarea și implementarea vaccinului Hib vor fi remise de către MS după primirea informației de la Alianța Globală pentru vaccinuri și Imunizări (GAVI) privind termenii de livrare a vaccinului în țară.

2. Planificarea și imunizarea contingentelor și grupurilor de risc:

a) Imunizări împotriva hepatitei virale B:

Pe parcursul a.2008 vor fi cuprinși cu vaccinarea împotriva hepatitei virale B persoane expuse unui risc sporit de infectare cu virusul hepatitei virale B:

- Lucrători ai instituțiilor medico-sanitare publice, nevaccinați pînă în prezent;
- Studenți și rezidenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie N.Testemițanu", studenți ai colegiilor de medicină, nevaccinați anterior;
- Persoane aflate în contact cu bolnavi de hepatită B acută și cronică, inclusiv cu purtători a AgHBs;

Vaccinarea va fi planificată după schema 0-1-2 luni. Persoanele care au primit anterior o doză de vaccin, indiferent de timpul trecut de la primirea ei, vor fi planificate pentru a fi vaccinate cu două doze cu un interval de o lună între ele; cei care anterior au primit două doze de vaccin, indiferent de timpul trecut de la primirea lor, vor fi

planificați pentru finalizarea cursului de vaccinare cu o doză. Persoanele purtătoare de AgHBs sau cele care au suportat hepatita virală B, confirmată prin investigații de laborator, nu necesită vaccinarea și nu vor fi incluse în planul de vaccinare. Doza de vaccin va fi stabilită, în dependență de vârsta persoanei, în corespundere cu recomandările instrucțiunii de utilizare a vaccinului.

b. Imunizări antigripale:

Pentru a.2008 va fi planificată vaccinarea antigripală pentru următoarele contingente:

Contingente profesionale expuse unui risc sporit de îmbolnăvire:

- Lucrători a instituțiilor medicale;
- Copiii și personalul din centrele de plasament;
- Personalul serviciului vamal;
- Personalul Ministerului Afacerilor Interne: șefi de post, inspectori de sector;
- Efectivul serviciului de grăniceri care activează în punctele de trecere a frontierei;
- Echipajele aeronavelor;

Persoane expuse unui risc sporit a complicațiilor în cazul suportării gripei:

- Bolnavi cu astm bronșic;
- Bolnavi cu insuficiență renală, aflați la hemodializă;
- Bolnavi cu diabet zaharat;
- Bolnavi cu patologii imunodeficitare (infecția HIV, patologii oncologice a sângelui) și bolnavi care primesc tratament cu imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide
- Copii și adolescenți (de la 6 luni la 18 ani), care au urmat tratament îndelungat cu preparate ce conțin acid salicilic și în rezultat pot fi expuși dezvoltării sindromului Ray în cazul suportării gripei.

Vaccinarea va fi planificată pentru lunile octombrie-decembrie.

c) Vaccinarea antirubeolica a femeilor de vîrstă fertilă:

Campania de vaccinare antirubeolică efectuată în anii 2002 - 2003 și imunizările antirubeolice planice a copiilor au redus esențial morbiditatea prin rubeolă și riscul apariției cazurilor de rubeolă congenitală. Inșă, în perioada realizării campaniei de vaccinare antirubeolice, o parte semnificativă de femei de vîrstă fertilă nu se aflau în țară și au rămas nevaccinate. În scopul reducerii riscului rubeolei congenitale la etapa planificării vaccinărilor va fi precizat statutul vaccinai antirubeolic la femeile de vîrstă 20-35 ani, cele nevaccinate fiind planificate pentru vaccinare în primele 6 luni ale a. 2008.

3. Prezentarea planurilor de vaccinare pentru acordare și aprobare în secția Epidemiologie Generală a CNȘPMP va fi efectuată concomitent cu dările de seamă pentru a.2007 de către șefii secțiilor de epidemiologie din CMP, CIE, medicii epidemiologi a serviciilor medicale ale Ministerelor și Autorităților administrative centrale.

4. Pentru acordarea planurilor de vaccinare se vor prezenta:

- Planul de vaccinare pe raion, municipiu/oraș, minister, serviciu, conform anexei nr. 1.
- Date privind numărul de populație deservit conform anexei nr.2.
- Raportul privind asigurarea cu vaccinuri, seringi și alte preparate imunobiologice conform anexei nr.3.
- Asigurarea instituțiilor medicale cu echipament pentru "lanțul frig" la 31.12.2007.

5. Directorul general al CNȘPMP dl. IonBahnarel:

- 5.1. A acorda ajutor metodic si consultativ instituțiilor medico-sanitare din țară, în planificarea vaccinărilor.
- 5.2. A asigura primirea și acordarea planurilor de vaccinare pe a.2008 până la 01.02.2008.
- 5.3. A prezenta planul de vaccinare totalizat pe țară pentru aprobare Ministerului Sănătății până la 15.02.2008.

Controlul asupra executării prezentului ordin se asumă viceministrului  
dlui Boris Golovin.

Ion ABABII

Ministru

Anexa nr.2

Date privind numărul de populație la 01.01.2008.

Anul nașterii	Grupele de vârstă (ani)	Numărul populației la evidență		
		Masculin	Feminin	<b>Total</b>
2007	0			
2006	1			
2005	2			
2004	3			
2003	4			
2002	5			
2001	6			
2000	7			
1999	<b>8</b>			
1998	9			
1997	10			
1996	11			
1995	12			
1994	13			
1993	14			
1992	15			
1991	16			
1990	17			
1989	18			
1988	19			
1983-1987	20-24			
1978-1982	25-29			
1973-1977	30-34			
1968-1972	35-39			
1963-1967	40-44			
1958-1962	45-49			
1053-1957	50-54			
1948-1952	55-59			
1947<...	>=60			
	<b>Total</b>			

Medic șef al CMP \_\_\_\_\_

RAPORT  
privind asigurarea cu vaccinuri, seringi, și alte preparate imunobiologice  
al CMP

	Vaccinu l	Unitate de măsură	Rest la 01.01.2007	Primit în a.2007	Rest la 01.01.2008	Termen de valabilitate
	A	B	c	D	E	F
I.1	<b>BCG</b>	<b>Doze</b>				
I.2	<b>HepB</b>	<b>Doze</b>				
I.3	VPO	<b>Doze</b>				
I.4	<b>DTP</b>	<b>Doze</b>				
I.5	Hib	Doze				
I.6	DT	<b>Doze</b>				
I.7	Td	<b>Doze</b>				
I.8	<b>ROR (1 doza/fl)</b>	<b>Doze</b>				
I.9	<b>ROR (5-10 doze/fl)</b>	<b>Doze</b>				
II.1	hepB - grup de risc	<b>Doze</b>				
II.2	HepA	<b>Doze</b>				
II.3	<b>Vaccin antignpal</b>	<b>Doze</b>				
IU	<b>Vaccin antirubeolic</b>	<b>Doze</b>				
II.5						
II.6						
II.7						
III.1	<b>Seringi BCG</b>	<b>Unitate</b>				
III.	<b>Seringi 0.5 ml</b>	<b>Unitate</b>				
III.	<b>Seringi 2 ml</b>	<b>Unitate</b>				
III.	<b>Seringi 5 ml</b>	<b>Unitate</b>				
III.5	Cutii de ardere a seringelor	<b>Unitate</b>				
IV.	<b>Tuberculină</b>	<b>Doze</b>				
IV.2						
IV.3						
IV.4						
IV.5						
IV.6						
IV.7						

Medic șef al CMP

CONFIRM

Medic șef al Centrului de Medicină Preventivă

**PLANUL DE VACCINĂRI**

a populației/ Hacenemin  
pe anul/ 3a TOA 2008.

	Contingentul / Vaccinul	Lunile//wecHUB;	3 luni	Lunile / Mecmu	6 luni	Lunile I Mecmu	9 luni	Lunile / Mecfmbi	Total p an
	KoHmuHaeHm / Bat<u,UHbt	1 II III	3 Mecnu a	IV V VI		VII VIII IX		X XI XII	Bceao H aod
0,1	Nr. estimat nou-nascuti in maternitate								
0,2	Nr. estimat copii <1 an care vor fi deserviți de medicina primară								
I	<b>Vaccinarea primara</b>		<i>fiepeimnan eaKu,uHau,ux</i>						
1.1	BCG -5l_1>K								
I.2	HepB1 -TenB1								
I.3	HepB2 -TenB2								
I.4	HepB3 -renB3					i			
I.5	VPO1 -onBi								
I.6	VPO2 -oriB2								
I.7	VPO3 -onB3								
I.8	DTP1 -AKf1CI								
I.9	DTP2 -AKf1C2								
1.10	DTP3 -AKf1C3								
-4J1	DT1 -AflC1								
1.12	DT2 -AflC2								
1.13	ROR1 - KF1K1								
II	<b>Revaccinari la vârsta 1-6 ani</b>		<i>PeeaxuuHawju e i-6nem</i>						
11.1	VPO4 - oriB4								
II.2	DTP4 - AKf1C4								
II.3	DT3 -A/1C3								
III	<b>Revaccinari la vârsta 7-13 ani</b>		<i>Peeat&lt;u,uHau,uue 7-i3nem</i>						
111.1	VPO5 - OF1B5								
III.2	DT5 -AflC5								
III.3	ROR2 - KF1K2	I							
III.4	BCG2 - Bl_1>K2	T							
IV	<b>Imunizări Ea adolescenți si adulți</b>		<i>MMMyHU3au.ua nodpocmKoe u epcnbix</i>						
IV.1	Td - 15 ani / AflC-M B 15 neT								

IV.2	Vac. <b>Td1</b> /BaKM. AflC-Mi																		
IV.3	Vac. Td2 / BaKLj. AflC-M2																		
IV.4	<b>Kevac. ia-aaum</b> / peBaKM. Aflc-MS3p.																		
V	<b>Vaccinări și revaccinări ne incluse în PNI</b>																		
		<i>tipueuKu ne exntmeHHbi</i>																	
V.1	HepB1-gr. risc <i>ITenBi - ap.</i> <i>pucm</i>																		
V.2	HepB2-gr. risc <i>IFenB2 - ap.</i> <i>pucxa</i>																		
V.3	HepB3-gr. risc <i>lfenB3-</i> <i>sp.pucKa</i>																		
IV.4	Antigripale <i>IflpueueKU np</i> <i>apunna</i>																		
IV.4	Antirubeolice/ <i>npomue</i> <i>xpacHyxu</i>																		
IV.5																			